

# TESTER-ALERTER-PROTEGER : ce qui change avec les variants du SARS Cov2

Synthèse du MARS 2021-08 du 07/02/2021

	Variant Anglais (20I/501Y.V1)	Variant Sud-Africain (20H/501Y.V2)	Variant Brésilien (20J/501Y.V3)
<b>TESTER</b>			
	Tout <b>test Antigénique ou PCR positif</b> fait l'objet par le laboratoire d'une <b>RT-PCR de criblage</b> en seconde intention, réalisée dans un délai de <b>36H</b> maximum, pour déterminer s'il s'agit d'un variant d'intérêt		
<b>ALERTER</b>			
	Le médecin doit sensibiliser le patient porteur d'un variant au risque de <b>contagiosité accrue</b> et à l'importance d'un <b>respect particulièrement strict de l'isolement et des gestes barrière</b>		
Contact-tracing	Les contacts à risque autour d'un porteur d'un variant devront <b>prévenir eux-mêmes les personnes avec qui elles ont été en contact à risque depuis leur dernière exposition à risque avec le cas index (contacts de seconde génération= « contacts de contact »)</b> . Pour celles-ci les recommandations suivantes seront proposées : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renforcer l'application des mesures barrières et notamment le port du masque</li> <li>- Télétravailler dès lors que cela est possible ;</li> <li>- Réduire volontairement ses contacts sociaux durant les 7 jours suivant ;</li> <li>- Réaliser un test diagnostic sans délai au 1er symptôme.</li> </ul>		
Délai de réalisation du test PCR pour les sujets contacts	Inchangé  <b>Pour un contact à risque du même foyer : J0 et J7</b> <b>Pour un contact à risque hors du foyer : J7</b> après le dernier contact avec le cas confirmé	<b>Tous les contacts à risque des personnes porteuses d'un variant Sud Africain ou Brésilien doivent bénéficier d'un test PCR à J0 (dès son identification)</b>  <b>Si test négatif à J0 : quarantaine de 7 jours avec mesures barrières renforcées et nouveau test PCR à J7</b>	
<b>PROTEGER</b>			
Suivi renforcé	Visites à domicile par des IDEL programmées et proposées systématiquement pour les cas confirmés et personnes contact d'un variant		
Durée d'isolement	Inchangé <b>Patient symptomatique : 8 jours</b> à partir de la DDS et 48h d'apyrexie et sans dyspnée <b>Patient symptomatique immunodéprimé : 10 jours</b> et 48h d'apyrexie et sans dyspnée <b>Patient asymptomatique : 10 jours</b> à partir du test positif	<b>Durée d'isolement portée à 10 jours.</b>  <b>Test de sortie d'isolement à faire à J10 par une IDE à domicile</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Si négatif et absence de fièvre depuis 48h : levée isolement</li> <li>✓ Si positif : isolement prolongé de 7 jours</li> </ul>	

