

CHECK LIST PRE-VACCINALE



Indication à la vaccination		
Depuis le 15 juin 2021, en l'absence de contre-indication, toutes les personnes âgées de 12 ans et plus, que ces personnes présentent ou non des facteurs de risque, sont éligibles à la vaccination contre la covid 19.		Pour les 18-55 ans : vaccin à ARNm Pour les > 55 ans : vaccin AZ ou JJ, si possibilité vaccin ARNm et possibilité de prime boost hétérologue à faire au bout de 4 semaines
Recherche de contre-indication à la vaccination		
<p>Choc anaphylactique à un composant du vaccin* Hypersensibilité PEG (CFpage2) ?</p> <p>Réaction sévère type myocardite, hépatite sévère et péricardite ayant nécessité une hospitalisation après une injection de vaccin à ARN messenger</p> <p>Syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS)</p>		<p>En cas de réactions anaphylactiques à des médicaments ou des aliments : pas de contre-indication, faire le vaccin (cf page 2)</p> <p>Si allergie grave connue affiner l'interrogatoire cf page2</p>
Recherche de non recommandation à la vaccination ou situation particulière		
Antécédents de COVID 19 /sérologie positive		En cas d'antécédents de la Covid-19 : attendre au moins 2 mois après l'épisode aigu ou à partir de la date de la sérologie pour vacciner.
Contage récent avec personne atteinte de COVID 19		Attendre le résultat de la PCR SARS Cov 2 de J7 avant de vacciner.
Etat infectieux sévère		<p>Etat clinique infectieux :</p> <p>-en cas de fièvre : dépistage recommandé de la COVID 19 par PCR SARS Cov 2</p> <p>-Reporter la vaccination en cas d'état clinique sévère (hyperthermie élevée, sepsis, infection bactérienne suspectée cliniquement)</p>
Grossesse		En cas de grossesse : vaccination recommandée à partir du 1 ^e trimestre. Privilégier vaccin à ARNm
Allaitement		En cas d'allaitement : Privilégier vaccin à ARNm
Injection d'un autre vaccin dans les 14j		Attendre 14 jours après la dernière injection d'un vaccin
Traitement anticoagulant		En cas de prise d'anticoagulant ou de trouble de l'hémostase : la vaccination par voie IM pourra être réalisée dans les mêmes conditions si l'intérêt de la vaccination l'emporte sur le risque. Après l'injection IM, faire une pression de 2 minutes au point d'injection. Ne pas faire l'injection SC OU IV et ne pas frotter après l'injection

*composants disponibles des vaccins : sur le site « mes.vaccins.net »



Exemple de molécules contenant du PEG :

PEG préparation colique, macrogols, interférons pégylés (VHC, anti-cancéreux, SEP), facteurs de croissance hématopoïétique pégylés (G-CSF et EPO), naloxone pégylée, chimiothérapies (irinotécan, asparaginase et doxorubicine pégylés), le certolizumab pégylé, et le facteur VIII et l'enrobage de nombreux traitements, Ciflox dont l'enrobage contient du polysorbate.

Interrogatoire approfondi en cas d'allergie sévères

Antécédent d'allergie à un des composants du vaccin en particulier aux PEG et par risque d'allergie croisée au polysorbate	Contre-indiqué	Adresser à un allergologue
Antécédents de réaction immédiate ^{**} , ^{***} à une première injection d'un vaccin ARN m COVID	Contre indiqué	Adresser à un allergologue
Antécédents de réaction immédiate ^{**} , ^{***} à un autre vaccin non COVID ou à un médicament injectable	Surseoir	Vaccination après avis d'expert (évaluation rapport bénéfice risque) et adresser à un allergologue
Réaction retardées médicamenteuses, toxidermies même graves (DRESS, Lyell, ou Stevens Johnson)	Vaccination normale	Surveillance 15 min
Allergie à un médicament oral		
Urticaire, angioedème	Vaccination normale	Surveillance 15 min
Anaphylaxie	Vaccination normale	Surveillance 30 min
Réaction retardées, toxidermies même graves (DRESS, Lyell, ou Stevens Johnson)	Vaccination normale	Surveillance 15 min
Antécédents familiaux allergiques, y compris anaphylaxie	Vaccination normale	Surveillance 15 min
Rhinite, conjonctivite, asthme allergique aux pneumallergènes	Vaccination normale	Surveillance 15 min
Eczéma de contact, urticaire ou angioedème chronique, angioedème bradykinique, mastocytose sans antécédents de réaction anaphylactique	Vaccination normale	Surveillance 15 min
Allergie au latex		
Urticaire, angioedème, eczéma	Vaccination normale	Surveillance 15 min
Anaphylaxie	Vaccination normale	Surveillance 30 min
Allergie aux venins d'hyménoptères		
Urticaire, réaction au site d'injection	Vaccination normale	Surveillance 15 min
Anaphylaxie	Vaccination normale	Surveillance 30 min
Allergie alimentaire		
Anaphylaxie	Vaccination normale	Surveillance 30min
Non grave, syndrome orl, urticaire, eczéma	Vaccination normale	Surveillance 15 min

** : bronchospasme, urticaire généralisé, anaphylaxie

*** : hors réaction locale qui autorise la vaccination normale avec 15 min de surveillance