

Médicaments dosés dans le Service de Pharmacologie - APHP. Nord Site Bichat

Adresse postale : 46, rue Henri Huchard, 75877 Paris Cedex 18 Tél. : 01.40.25.84 54 Fax : 01.40.25.88.12

Adresse de livraison : 17 rue du Pasteur Valéry Radot - **Porte 7** - 75018 PARIS (UNIQUEMENT du lundi au vendredi de 9h à 17h30) (-2)

CADRE RESERVE AU LABORATOIRE : Revue de contrat.			☐ Sachet Noir
Type et nombre de prélèvements reçus :		Date et heure d'arrivée à l'accueil du site expéditeur - Visa	
Non-conformité critique ☐ Echantillon(s) non identifié(s) ☐ Discordance Echant/Prescription ☐ Echantillon(s) manquant(s) ☐ Contenant non adapté ☐ Echantillon(s) accidenté(s)	Tel : ☐ Oui ☐ Non ☐ Autres NC Critique	☐ Si Pré-traitement : ☐ Centrifugation ☐ Décantation ☐ Pas de pré-traitement ☐ Conservation avant envoi ☐ TA ☐ 2 à 8°C ☐ - 20°C	
Date et heure d'arrivée à l'accueil du site destinataire - Visa			

☐ Pres. Abs.
☐ Prel. Abs.
☐ UHabs
☐ Cond. trans
☐ Tub +
☐ Autres

Feuille 1	Feuille 2	Feuille 3	Feuille 4	Feuille 5
Amoxicilline CLAMOXYL® Avibactam/Aztreonam EMBLAVEO® Avibactam/Ceftazidime ZAVICEFTA® Aztreonam AZACTAM® Bédacquinol et métabolite SIRTURO® Céfazoline Céfépime AXEPTEM® Céfideraccol FETCROJA® Céfotaxime CLAFORAN® Céfotaxime Ceftazoline ZINFORO® Ceftazidime FORTUM® Ceftiozane ZERBAXA® Ceftriaxone ROCEPHINE® Ciprofloxacin CIPLOX® Clarithromycine ZECLAR® Clindamycine DALACINE® Clofazimine LAMPRENE® Cloxacilline ORBENTINE® Cycloserine SEROMYCIN® Daptomycine CUBICIN® Dalbavancine XYDALBA® Délanamide et métabolite DELTYBA® Doxycycline Eravacycline XERAVA® Ertapénem INVANZ® Ethambutol MYAMBUTOL® Fosfomycine FOSFOCINE® Imipénem TIENAM® Isoniazide RIMIFON® et métabolite Levofloxacine TAVANIC® Linezolid ZYVOXID® Méropénem MERONEM® Moxifloxacine LIZILOX® Ofloxacine OFLOCT® Oxacilline BRISTOPEN® Pénicilline G EXTENCILLINE® Pipéracilline Pipéracilline/Tazobactam TAZOCILLINE® Pyrazinamide PIRILENE® Rifabutine et métabolite ANSATIPINE® Rifampicine RIFADINE® Spiramycine RODOGYL® Sulfaméthoxazole et métabolite/Triméthopri-me BACTRIM® Tedizolide SIVEXTRO® Temocilline NEGABAN® Tigécycline TYGACIL®	3TC+ABC KIVEXA® 3TC+ABC+DTG TRIUMEQ® Abacavir (ABC) ZIAGEN® Atazanavir (ATV) REYATAZ® AZT + 3TC COMBIVIR® Bicétegravir (BIC) BIC+FTC+TAF BIKTARVY® Cabotégavir Darunavir (DRV) PREZISTA® Dolutégravir (DTG) TIVICAY® Doravirine (DOR) PIFELTRO® DOR+3TC+TDF DELSTRIGO® Efavirenz (EFV) SUSTIVA® Emtricitabine (FTC) EMTRIVA® Etravirine (ETR) INTELENCE® Fostemsavir (TMR) EVG+COBI+TAF+FTC GENVOYA® EVG+COBI+TDF+FTC STRIBILD® FTC + TDF TRUVADA® FTC+TAF+RPV ODEFSEY® FTC+TDF+EFV ATRIPLA® FTC+TDF+RPV EVIPLERA® Lamiuvudine (3TC) EPIVIR®/ZEFFIX® Lénacavapir (LEN) SULENCA® Lopinavir (LPV) et ritonavir (RTV) KALETRA® Maraviroc (MVC) CELESTRI® Névirapine (NVP) VIRAMUNE® Raltégravir et métabolite (RAL) ISENTRESS® Rilpivirine (RPV) EDURANT® Ritonavir(RTV) NORVIR® Ténofavir (TDF) VIREAD® Ulovinirine Zidovudine et métabolite (AZT) RETROVIR® Screening ARV	Amiodarone et métabolite CORDARONE® Ciclosporine® Cinétique de MPA Clozapine et métabolite LEPONEX® Evérolimus® CER TIGAN® Flecainide® FLECAINE® Hydroxychloroquine® PLAQUENIL® Mycophénolate® (MPA) CELLCEPT® Rapivacaine® NAROPINE® Sirolimus® RAPAMUNE® Tacrolimus®	Aciclovir (ACV) et métabolite ZOVIRAX®/ZELITREX® Albendazole et métabolite Aménamévir AMENALIEF® Amphotéricine B® AMBISOME® Anidulafundine ECALTA® Atovaquone® WELLVONE® Caspofungine® CANCIDAS® Dapsone® DSULONE® Fluconazole® TRIFLUCAN® Flucytosine® ANCOTIL® Ganciclovir (GCV) CYMEVAN®/ROVALCYTE® Glécoprévir et Pibrentasvir (GVR-PIB) MAVIRET® Isavuconazole® CRESEMBA® Itraconazole® et métabolite SPORANOX® Ivermectine STROMECTOL® Letermovir (LMV) PREVYMIS® Maribavir (MBV) LIVTENCITY® Métronidazole® FLAGYL® Micafungine MYCAMINE® Nirmatrelvir/Ritonavir PAXLOVID® Ornidazole® TIBERAL® Osetamivir et métabolite (OSEL) TAMIFLU® Posaconazole® NOXAFIL® Praziquantel BELTRICIDE® Praguantel et métabolite PALUDRINE® Pyriméthamine® MALOCIDE® Remdesivir et métabolite VEKLURY® Rézafungine REZZAYO® Ribavirine (RBV) COPEGUS®/REBETOL® SOF + velpatasvir (VEL) EPCLUSA® Sofosbuvir et métabolite (SOF) SOVALDI® Sulfadiazine ADIAZINE® Voriconazole et métabolite VFEND®	Amloride Amlodipine Bisoprolol Canrenone et Spironolactone Diltiazem Epléranone Furosemide Hydrochlorothiazide Indapamide Irbesartan Lercanidipine Nebivolol Nicardipine Perindopril et Perindoprilat Ramipril et Ramiprilat Rilmenidine Urapidil Valsartan

CONDITIONS DE PRELEVEMENT

Dosages dans les autres liquides biologiques : pot stérile sans conservateur
 Modalités de prélèvement :
résiduel (Cmin) dans l'intervalle des 30 min avant IV ou PO
pic (Cmax) : Tmax IV : 30 min à 45 min après la fin de la Perf. au bras opposé
 Tmax IM, SC : 1h après IV
 voir catalogue des examens VISKALI : <https://hupnvs.manuelprelevement.fr>
Perfusion continue : sans contrainte horaire, au bras opposé

FACTURATION

- Tableau national de codage de biologie
 - Référentiel des actes innovants hors nomenclature de biologie et d'anatomopathologie (RIHN)

CONDITIONS D'ACHEMINEMENT

Pour les molécules Ciclosporine, Tacrolimus, Evérolimus, Sirolimus et Hydroxychloroquine, **analyse réalisée sur sang total - ne pas centrifuger**

Prélèvement HORS BICHAT

Centrifuger (10 min à 4 000 tours) et décanter le plasma et le congeler rapidement (au maximum 8h)

Imipénème : Stabilisation du plasma par du **MOPS** dans les 45 minutes suivant le prélèvement (dilution au 1/2 v/v)

Rifampicine : Stabilisation du plasma par l'**acide ascorbique** 200 mg/L (dilution au 1/2 v/v) dans les 2 heures suivant le prélèvement

Antibiotiques : Plasma à -20°C (acheminement dans la carboglace si la durée de transport le nécessite)

ZONE DE TAMPON DE RECEPTION